


Aus der Universitäts-Frauenklinik Erlangen. (Vorstand:
Prof. Dr. med. et phil. Wintz).

1936

Die klinischen Erfolge der Progynontherapie.



Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Annemarie Thomas

aus Salzuflen

Tag der mündlichen Prüfung: 2. Dezember 1936.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.

1936

937/20

Referent: Prof. Dr. R. Dyroff

Dekan: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. med. Friedrich Jamin

Meinen lieben Eltern in Dankbarkeit gewidmet.

Schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts finden wir die Anfänge der Lehre, daß die Geschlechtsdrüsen neben der Produktion der Keimzellen noch eine 2. Aufgabe zu erfüllen haben, nämlich für die normale Entwicklung, für Wachstum und Funktion der Genitalorgane, für die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale zu sorgen.

Die Grundlage für diese Lehre von der inneren Sekretion schufen die Experimente Berthold's in Göttingen, der kastrierten Hähnen die Hoden wieder einpflanzte. Beachtung fand dies erst nach den Arbeiten von Brown-Séquard im Jahre 1889. Es folgten die Transplantationsversuche von Knauer u. Halbach, später von Lipschütz und Steinach. Ein einwandfreier Beweis für die Hormonbildung im Eierstock war jedoch erst damit geliefert, als sich herausstellte, daß sich Kastrationsercheinungen durch Injektion von Ovarialextrakten beheben ließen. Nachdem die Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet hingelenkt worden war, folgte nun eine Zeit der verschiedensten, sich oft sogar widersprechendsten Ergebnisse. Der Grund hierfür lag in den schwierigen und verschiedenen, oft stark voneinander abweichenden Arbeitsmethoden. Die Forscher, die sich mit dem biologisch-chemischen Problem der Ovarialfunktion und Menstruation beschäftigten, machten ihre Versuche mit Preßsäften, mit wässerigen oder mit alkoholischen Extrakten entweder des ganzen Eierstocks oder des Corpus luteum allein. Zu der Verschiedenheit der Extrakt- und Preßsäftewirkung kam also noch die weitere: einmal wirksamer Stoff aus dem ganzen Ovar, ein anderes Mal aus Corpus luteum allein und schließlich Eierstocksubstanz ohne Corpus luteum. Außerdem konnte von einer exakten, für die Beurteilung der Wirkungsweise unentbehrlichen Dosierung natürlich gar keine Rede sein. Das einzige positive Ergebnis der mannigfaltigen Versuche war das, daß es teils durch Verfütterung von Ovarialpräparaten, teils durch Einspritzung von Extrakten gelungen war, im Tierexperiment eine Hyperämie und Vergrößerung des Uterus, teilweise

auch Blutaustritte aus den Genitalien zu erzeugen. Adler und Schücke konnten beim Menschen in zwei Fällen von Amenorrhoe durch Verabreichung von Eierstocksubstanz und Corpus luteum je eine Menstruation auslösen.

1914 veröffentlichten Seitz und Wintz die ersten klinischen Ergebnisse ihrer gemeinsamen Untersuchungen über die Hormone des Corpus luteum. Es gelang ihnen die Darstellung zweier Fraktionen aus dem Corpus luteum: einer wasserlöslichen, die sie Lipamin (Fabrikname „Agomensin“) und einer öllöslichen, die sie Luteolipoid („Sistomensin“) nannten. Die Amenorrhoe galt schon seit Bestehen einer innersekretorischen Therapie als das Hauptanwendungsgebiet der Ovarialpräparate; nachdem nun im Tierversuch Erfahrungen über die Wirkungsweise des Lipamins gemacht worden waren, (vermehrtes Wachstum von Uterus und Ovarien) wurde es deshalb bei Frauen mit Amenorrhoe ohne nachweisbaren Genitalbefund angewandt. 1932 berichtete Wintz über seine Erfolge mit dem Präparat nach 18jähriger klinischer Erfahrung. Er erbrachte bei 134 kritisch ausgesuchten Fällen von ovarieller Amenorrhoe den Beweis der Wirksamkeit und Brauchbarkeit der Agomensinbehandlung. Der ovarielle und menstruelle Zyklus ließ sich also beeinflussen, aber immer noch fehlte die Erfüllung der wichtigen Forderung eines spezifischen, zuverlässigen Tests, der die Möglichkeit brächte über den Grad der erzielten Anreicherung sichere Auskunft zu geben.

Die großen Fortschritte, welche die Erforschung der weiblichen Keimdrüsenhormone im letzten Jahrzehnt machen konnte, fußen auf zwei fundamentalen Entdeckungen:

1. Die Testreaktion auf das Follikelhormon von Allan und Doisy am kastrierten Nagerweibchen (ME).
2. Die Beobachtung von Aschheim-Zondek über das reichliche Vorkommen des Follikelhormons im Harn schwangerer Frauen und besonders schwangerer Stuten.

Weitere Aufklärung über die Natur des Follikelhormons war nun Sache der Chemiker; bereits 1929 gelang Butenandt die Isolierung des chemisch reinen Follikelhormons. In der Therapie mit weiblichen Keimdrüsenhormonen zeigte sich der klinische Erfolg aber erst, als es den Forschungen im Hauptlaboratorium der Schering-Kahlbaum AG. gelang durch chemische Umwandlungen

Derivate des Follikel-Hormons herzustellen, die es ermöglichen in kleinsten Flüssigkeitsmengen Follikelhormondosen in Höhe von 10 000, 50 000, ja 100 000 ME zu verabreichen und so eine Depotwirkung zu schaffen, die den Hormonspiegel während längerer Zeit auf bestimmter Höhe hält. Dieses ölgelöste Hormon „Progynon Boleosum“ besitzt als Benzoesäureester des Dihydrofollikelhormons pro gr eine Wirksamkeit von 10 Mill. ME. Doisy hat festgestellt, daß das Ovarium in der Hauptsache Dihydrofollikelhormon enthält, sodaß Progynon B höchstwahrscheinlich weitgehend der im lebenden Körper vorkommenden Form des Follikel-Hormons entspricht.

Zusammen mit dem von Corner und Allen entdeckten Hormon des Corpus luteum konnte man nun ein neues Problem in Angriff nehmen, nämlich die Anzahl Einheiten festzustellen, die zum physiologischen Aufbau der Uterus Schleimhaut nötig sind. 1932 gelang es Kaufmann als erstem bei einer 5 Jahre vorher operativ kastrierten Frau mit atrophischer Uterus Schleimhaut die zyklischen Veränderungen der Schleimhaut herbeizuführen. Er injizierte 21 Tage lang täglich 10 000 ME Progynonbenzoat und anschließend 7 Tage lang täglich 5 KE Corpus luteum Hormon. Die durch Abrasio gewonnene Schleimhaut zeigte histologisch die typische Sekretionsphase. Beim nächsten Versuch erfolgte spontane Ausstoßung einer derartigen Schleimhaut, also Menstruation. Aus diesen klassischen Versuchen ergaben sich zwei wichtige Tatsachen: Das Follikelhormon und das Corpus luteum Hormon sind die beiden einzigen zum Schleimhautaufbau und zur Schleimhautumwandlung notwendigen Keimdrüsenhormone. Zum Schleimhautaufbau bei der kastrierten Frau sind Dosen von Follikelhormon nötig, die weit höher liegen, als bisher angenommen wurde.

Dieser erste Kaufmannsche Versuch ergab also einen Anhaltspunkt für die Höhe der physiologischen Dosen. Seine weiteren Erfolge bestätigten die Richtigkeit der Dargelegung von 2—300 000 ME Progynonbenzoat und 33 KE Corpus luteum Hormon, letztere testiert am infantilen Kaninchenuterus nach Clauberg. In der Würzburger Klinik wurden seine Ergebnisse von Buschbeck mit demselben Erfolg bestätigt: Bei 16 amenorrhöischen Patientinnen gelang es mit diesen Normaldosen echte Menstruationsblutungen hervorzurufen.

Diese neue Therapie, die wir Kaufmann verdanken, hat man oft die Therapie mit den hohen Follikelhormondosen genannt. Hierzu schreibt Schöller, daß man lieber von der physiologischen Dosis der Frau reden sollte, denn wenn man die verwendete Hormonmenge gewichtsmäßig definiert, dann ist sie klein. Bei Verwendung von Dihydrofollikelhormonbenzoat sind es nur 25 mg Substanz, welche sich auf 20 Tage verteilen. Eine Dosis von etwas über 1 mg pro Tag wird niemanden groß erscheinen.

Buschbeck gibt später einen Bericht über 37 mittels dieser Hormonmengen künstlich erzeugte Menstruationen bei sekundär amenorrhöischen Frauen; er fand dabei heraus, daß die Stärke der Regelblutung allein von der Größe der Progynondosis abhängt. Dadurch kam er auf den Gedanken Hypomenorrhöen nur mit Progynon zu behandeln, er beschränkte die Hormonzufuhr auf die erste Zyklushälfte, da sonst eine Störung des Rhythmus eintreten würde. Buschbeck hatte mit seiner Behandlungsmethode sehr gute Erfolge und erklärt sie damit, daß in den betreffenden Fällen unerschwellige ovarielle Zyklen vorlagen und er die mangelhafte Hormonproduktion durch künstliche Hormonzufuhr ausglich.

In dieser Zeit folgen nun von den verschiedensten Autoren die Veröffentlichungen ihrer Behandlungsergebnisse mit Progynon B oleosum.

Vor allem macht Loefer immer wieder darauf aufmerksam, daß es auf die Höhe der Dosis ankomme, sodann auf den richtig abgestimmten Synergismus zwischen den beiden Ovarialhormonen um die atrophische Schleimhaut funktionstüchtig aufzubauen. Als es ihm 1932 gelang mit 400 000 ME Follikelhormon und 40 KE Corpus luteum Hormon bei einer Frau mit sehr kleinem Uterus und vielleicht sogar fehlenden Ovarien eine Menstruation zu erzielen, war ihm dies der erste Anhalt für die Möglichkeit von dem bisher üblichen Tiertest vielleicht auf einen Menschentest zu kommen. Doch hielt er die hormonale Menstruationsdosis damit nicht für etwas quantitativ festgelegtes. Bei einem zweiten Fall betrug die notwendige Dosis nur 300 000 ME Progynon und 50 KE Corpus luteum. Jedoch hält er diese künstliche Menstruationsdosis für größer als die natürliche hormonale Menstruationsdosis, die vom normalen Ovar in 28 Tagen produziert wird. Bei einer gesunden Frau ist der

Uterus, das hormonale Erfolgsorgan des Ovars, besser und dauernd auf die ununterbrochen erzeugten Hormonmengen eingestellt; er wird also schon nach kleineren Hormonmengen reagieren als der einer kastrierten, sekundär oder primär amenorrhöischen Patientin.

Baltzer-Tübingen berichtet über 16 der Progynon-Proluton-Kur unterworfenen und mit gutem Erfolg behandelte Fälle.

Man darf jedoch nicht glauben, daß die Auslösung einer Menstruation das einzige Ziel sei, man also nur die generative Funktion in Tätigkeit setzen wollte. Oft, meist bei primär Amenorrhöischen, aber auch häufig bei sekundär Amenorrhöischen, ist der Uterus so klein, daß daran noch gar nicht gedacht werden kann. Hier ist vorderhand der Wachstumseffekt das wertvollste der Progynontherapie. Clauberg zeigt in seinen Studien am infantilen und insuffizienten menschlichen Uterus, daß es gelingt auch den kleinsten Uterus mit entsprechend hohen Follikelhormondosen zum Wachsen zu bringen. Er weist hierbei auch auf den Unterschied zwischen vegetativer und generativer Funktion hin, daß ein kleiner Uterus nicht amenorrhöisch zu sein braucht, während es ein normal großer sein kann. Die Notwendigkeit höherer Hormondosen, die man damals noch nicht kannte, ist die Ursache der anfänglichen Mißerfolge bei hypoplastischem Genitale. So schreibt Kaufmann noch 1932, daß man primäre Amenorrhöen besser gar nicht behandle, da man doch keinen Wachstumseffekt des hypoplastischen Uterus erwarten könne, desgleichen bei sekundärer Amenorrhöe mit erheblicher Unterentwicklung des Uterus.

Inzwischen aber gelang es Loefer und Clauberg bei Frauen mit hypoplastischem Genitale durch ausreichende Zufuhr der beiden Ovarialhormone echte menstruelle Blutungen und Uteruswachstum herbeizuführen. Das Wesentliche der Therapie war dabei, daß die bei normalen Individuen vor und in der Pubertätszeit jahrelang wirksame eigene Follikelhormonproduktion nachgeahmt werden mußte, ehe es zu einem in seiner Größenentwicklung normalen Verhältnissen gleichen Uterus kam. Siebke gibt in peroralen Kuren Dosen von bis zu 100 000 ME Follikelhormon an. Wenn man den peroralen Verlustfaktor noch mit bedenkt, dann ist bei ihm die Beeinflussung des Uteruswachstums

und der Schleimhautbildung nur verständlich, wenn man eine kumulierende Wirkung niedriger Hormondosen bei lang dauernder peroraler Applikation annimmt. Eine Therapie mit „hohen“ Dosen scheint ihm nur bei schwereren Graden ovarieller Insuffizienz angezeigt.

Der therapeutische Effekt ist im Wesentlichen von dem Funktionszustand des Uterus, dem Grad der Ovarialstörung abhängig. Dabei lassen sich keine bestimmten Mengen Progynon als therapeutische Dosen festlegen, die Menge von 2—300 000 ME Progynon und 30 KE Proluton ist lediglich ein Anhaltspunkt für die Dosierung. Da die Stärke der Eierstockinsuffizienz verschieden ist, kommt es auch gar nicht auf eine Mindestdosis an. Ein geringes Minus an Follikelhormon kann die Amenorrhoe bedingt haben und falls dieses durch künstliche Zufuhr ausgeglichen wird, tritt der Erfolg, also die Menstruation nach verhältnismäßig geringen Follikelhormondosen ein; ist das Minus im anderen Fall sehr groß, so müssen entsprechend größere Mengen zugeführt werden und die Behandlung dauert länger bis sie zum gewünschten Erfolg führt. Weil es sich nicht nur um eine Unterbilanz im Hormonspiegel handelt, schreibt A. Streck, sondern als Folge einer Störung der Zyklushormonproduktionsstätte im Ovar auch der fortlaufende lokale Hormonbedarf nicht gedeckt werden kann, muß hier wohl nach Eintritt der ersten Periode, als Ausdruck des hergestellten Bilanzausgleiches im Hormonspiegel, weiterhin Zyklushormon zugeführt werden.

Aus Versuchen an Mäusen leitet Hauptstein für die Anwendung des Follikelhormons beim Menschen ab, daß die Verabfolgung physiologischer Mengen des Follikelhormons im Sinne einer rationellen Therapie zur Zeit der Proliferationsphase anzuraten sei, doch warnt er vor einer Dauerzufuhr unphysiologisch großer Hormonmengen wegen der Gefahr einer Schädigung der Eireifungstätigkeit.

Alle erreichten Erfolge bestanden in durch regelmäßige Hormoninjektionen ausgelösten Menstruationen und außerdem im Wachstum des unterentwickelten Uterus. Nur einige Male berichten verschiedene Autoren über spontane Regulierung des Zyklus, sodaß ohne neuerliche Behandlung in rhythmischen Abständen Menstruationen auftraten. Obwohl zugegeben werden muß, daß für eine amenorrhoeische Frau schon einmaliger Regeleintritt ein physisches

Erlebnis bedeutet und ihr das Gefühl der Minderwertigkeit nimmt, sind es doch die Dauererfolge, die wir anstreben. Bei der bisherigen Progynon-Proluton-Therapie blieb die Periodenblutung nach Aussetzen der Injektionen meist wieder aus. Diese Unzulänglichkeit und daneben der unerschwinglich hohe Herstellungspreis für das Corpus luteum Hormon führten Buschbeck zu dem Versuch, mit Progynon allein zum Ziel zu kommen. Es traten auch Blutungen ein, aber keine echten Menstruationsblutungen, sondern solche aus einer proliferierten Schleimhaut, dieselben, die Clauberg bei gleicher Voraussetzung erlebt hatte und „Follikelhormonabbruchblutungen“ genannt hatte. Loefer sah nach alleiniger Progynonbehandlung schwache Blutungen auftreten, konnte sie aber auch nicht als echte Menstruationen beweisen. Nach Kaufmann führte die reine Progynontherapie ohne nachfolgende Prolutonzufuhr bei sekundärer Amenorrhoe in einigen Fällen zu Blutungen, die sich mikroskopisch als echte menstruelle Blutungen mit Zerfall einer prägraviden Schleimhaut erwiesen. Doch nicht allein das! In drei Fällen traten nach Abschluß reiner Progynongaben in rhythmischen Abständen spontan weitere Blutungen auf.

Dem Auftreten dieser Erfolge entsprechen die Befunde Hohlweg's in Tierexperimenten: er sah die Regeneration juniler Ovarien bzw. die Erzeugung von Corpora lutea am infantilen Ovar durch hohe Progynondosen.

Diese schönen Ergebnisse überbietet Buschbeck noch mit der Mitteilung eines Falles, wo nach zweijähriger Amenorrhoe und Sterilität auf Injektion von zweimal 100 000 ME Progynon je eine Blutung und schließlich Gravidität eintrat. Dabei stellt Verfasser die Frage, ob dadurch eine Eireifung oder eine Nidationsmöglichkeit bewirkt wurde. Auch von anderen Therapeuten liefen Meldungen über eingetretene und zum Teil schon normal ausgetragene Schwangerschaften ein.

Diese Erfolge wurden nun von den verschiedensten Seiten und Gesichtspunkten aus erklärt und immer wieder wurde die Frage diskutiert: Treiben wir mit einer ausreichenden Ovarialtherapie nur reine Substitutionstherapie oder können wir annehmen, daß wir bei der Zufuhr physiologischer Hormondosen eine Wirkung auf die übrigen Inkretdrüsen hervorrufen.

Siegert geht vom Standpunkt der Substitutionstherapie

aus und hält deshalb den Wert der reinen Follikelhormondarstellung für die Therapie für fraglich. Einen Fortschritt in der Behandlung mit Sexualhormonen sieht er in der richtigen Anwendung hormonhaltiger Organsubstanz und erwartet eine weitere Förderung durch kombinierte Zufuhr mit anderen Hormonen. Er treibt Kombinationstherapie, indem er das der Ovarialhormonproduktion übergeordnete Hypophysenvorderlappenhormon mit dem Gebrauch von Follikelhormon verbindet. Dadurch will er eine gegenseitige Leistungssteigerung bewirken: nicht nur die Hypophyse beeinflusst die Ovarialfunktion, sondern durch diese wird auch die Hypophysentätigkeit beeinflusst.

Wenn es richtig ist, daß der normale ovarielle Zyklus mit einem hypophysären in Wechselwirkung steht, dann hält Kaufmann die Hoffnung für berechtigt, den ovariellen Zyklus amenorrhöischer Frauen durch ausschließliche Follikelhormonbehandlung wieder vollkommen in Gang zu bringen. Mandier Fall von Amenorrhoe beruht aber nicht nur auf einem minderwertigen Eierstock, sondern auf niedriger Leistungsfähigkeit des gesamten endokrinen Systems. Die Dauerheilung eines solchen Falles mit Follikelhormon würde uns beweisen, daß wir damit keine ausschließliche Substitutionstherapie getrieben haben, sondern daß das Follikelhormon auch andere innersekretorische Drüsen zu vermehrter Arbeit angeregt hat, im anderen Falle müßte die Wirkung sofort nach Aufhören der Injektionen verpufft sein.

Den ersten Weg in dieser Hinsicht wiesen die Tierversuche von Baniecki, Sigmund, Bachner, Hohlweg, Clauberg und Neumann, nach welchen man den Hypophysenvorderlappen mit Follikelhormon beeinflussen kann. Hirsch-Hofmann hatte dargelegt, daß das Sexualhormon allein die Funktion eines ruhenden Ovars nicht anzuregen vermöge, daß es aber zur Proliferation der Gebärmutter-schleimhaut und zur Blutung daraus führen könne, ohne daß es sich um echte Menstruationsblutung handele. Diese Einengung erschien fraglich, denn von den verschiedensten Autoren wurden Erfolge in der Behebung von Amenorrhöen mit Sexualhormon allein berichtet. Dieser Widerspruch findet in späteren Erörterungen über die Zwischenschaltung des Hypophysenvorderlappens seine Erklärung (vergleiche unten).

Wagner wies darauf hin, daß ein so wieder zustande

gekommener Zyklus nur auf erneuter Tätigkeit der bis dahin nicht arbeitenden Ovarien beruhen könne; Erklärung hierfür wäre die Abtötung eines antogonistischen Einflusses irgendeiner anderen inkretorischen Drüse.

Vom Wirkungsmechanismus des Follikelhormons und des Hypophysenvorderlappenhormons galt als erwiesen, daß beide stark hyperämisierend auf Ovarium, Uterus und Vagina wirken. Gragert versuchte nun bei Frauen mit sekundärer Amenorrhoe oligo-hormonaler Ätiologie mit deutlicher Uterushypoplasie, bei welchen alleinige Follikelhormontherapie keinen Erfolg gebracht hatte, daß HVL-Hormon zur Therapie mit heranzuziehen als übergeordnetes Hormon. Er erreichte damit bei 5 Frauen nicht nur eine einmalige Blutung, sondern es ließen sich in regel- bzw. auch unregelmäßigen Abständen spontan wiederkehrende Menstruationen von individuell verschiedener Stärke und Dauer erzielen. Die systematische Therapie mit HVL-Hormon scheitert jedoch nach Laquer an den Präparaten mit zu wenig Einheiten.

Hohlweg stellte neue Versuche mit hohen Follikelhormondosen an und fand als regelmäßige Wirkung eine Vergrößerung des HVL und regelmäßig ausgesprochene Luteinisierung. Wenn Adler ebenfalls über den Erfolg alleiniger Progynonbehandlung berichtet, obwohl dies mit der Theorie nicht ganz übereinstimme, so, meint er, dürfe man doch nicht vergessen, daß man auch schon vor Entdeckung der ME mit alten, guten Ovarialpräparaten Erfolge erzielt habe (Agomensin, Ovariumpanhormon, Glandobolin). Er findet dafür zwei Erklärungen: entweder sind die in Frage kommenden Präparate nicht rein oder sie wirken auf dem Umweg über das Ovarium auf den HVL, sodaß von diesem aus die Luteinisierung vorgenommen wird. Eine Beeinflussung des HVL durch Follikelhormon nimmt auch Clauberg an. Von wesentlicher Bedeutung beim unterwertigen Individuum scheint ihm außerdem die Konstitution. Im Vordergrund steht oft die Störung des hormonalen Gleichgewichts in der Korrelation der gesamten endokrinen Drüsen. Wenn neben anderen Drüsen das Ovarium auch dysfunktioniert, tritt eine Erschwerung des Krankheitsbildes ein, da die Allgemeinwirkung des sonst dauernd im Ovar erzeugten Follikelhormons mitwegfällt. Da hohe Dosen Follikelhormon den HVL bremsen (Clau-

berg), erfolgt also mit den Hormonen des Ovariums eine Beeinflussung des Ovars auf indirektem Wege über den HVL.

Noch weiter in dieser Hinsicht gehen die Forschungsergebnisse Butenandt's. Die Veränderungen der Kastrationshypophyse sind durch Zufuhr von Keimdrüsenhormonen zu beheben; die Kastrationshypophyse selbst produziert in erhöhtem Maße gonadotropes Hormon, also übergeordnetes Sexualhormon. Aus diesen beiden Tatsachen folgt, daß die Keimdrüsenhormone rückwirkend die Produktion von übergeordnetem Sexualhormon bremsen. Da die Rückwirkung der Keimdrüsenhormone nur auf die intakte, nicht aber auf die implantierte Hypophyse erfolgt, ist als wahrscheinlich anzunehmen, daß diese Steuerung nicht direkt, sondern über ein Sexualzentrum erfolgt, dessen Sitz wahrscheinlich im Mittelhirn anzunehmen ist. (Hohlweg und Junkmann). Bei Absinken des Keimdrüsenhormonspiegels regt das Sexualzentrum die Hypophyse auf dem Nervenwege an, bei steigendem Keimdrüsenhormonspiegel unterbleibt diese Anregung. Durch diese Wechselbeziehungen gewinnen wir Einblick in den Mechanismus des Menstruationscyclus bei der Frau.

Nebenstehend bringe ich eine Skizze von Prof. Schoeller, die das Zusammenwirken von Mittelhirn, Hypophyse, Ovarium und Uterus darstellt. In diesem Schema ist der Anschauung, daß der luteinisierende Reiz ebenfalls von der Hypophyse auf hormonalem Wege (Prolan B) ausgehen soll, die Ansicht Schoellers entgegengestellt, daß Bildung und Erhaltung des Corpus luteum dem Ei zugesprochen werden muß (Robert Meyer's Lehre „Primat des Eies“).

Aus all diesen Erkenntnissen theoretischer und praktischer Art geht jedenfalls als sicher hervor, daß die cyclischen Vorgänge nur durch die beiden Sexualhormone, das Follikelhormon und das Corpus-luteum-Hormon, bedingt sind, und daß somit bei der nachhaltigen Rückwirkung des Progynon B oleosum auf die Tätigkeit des Hypophysenvorderlappens die Progynonbehandlung keine Substitutionstherapie bedeutet, sondern wertvollste Stimulationstherapie darstellt.

Folgende Untersuchungen sollen einen weiteren Beitrag liefern zur Frage der Beeinflussbarkeit der ovariellen Hypofunktion, und zwar soll einerseits der Erfolg einer kombinierten Behandlung mit den von der Firma Schering-

Bevor ich über meine eigenen Behandlungsergebnisse berichte, möchte ich kurz umreißen, wie wir uns den normalen Cyclusbau bei der Frau heute vorstellen.

Es ist das Verdienst Schröder's durch systematische Untersuchungen gezeigt zu haben, daß die Periodenblutungen lediglich den Abschluß eines auf die Befruchtung des Eies gerichteten Prozesses darstellen, und daß die cyclischen Veränderungen der Gebärmutter Schleimhaut im engsten Zusammenhang mit den Vorgängen im Ovar stehen. Das Zusammenwirken der Sexualhormone im weiblichen Organismus stellt man sich heute etwa folgendermaßen vor: Die Hypophyse, und zwar der Hypophysenvorderlappen, liefert zunächst das Follikelreifungshormon (Prolan A), unter dessen Einfluß der Follikel heranreift. Der wachsende Follikel erzeugt das eigentliche Follikelhormon (Sexualhormon), welches die ersten prämenstruellen Veränderungen der Uterus Schleimhaut bewirkt: die sogenannte „Proliferation“. Etwa in der Mitte des Intermenstruums erfolgt der Follikelsprung, nach Ansicht einiger Autoren unter dem Einfluß des ebenfalls in der Hypophyse gebildeten Prolan B. Es kommt nun zur Luteinisierung des Eibettes, zur Bildung des Corpus luteum. Unter dem Einfluß des Corpus-luteum-Hormons kommt es zu den hochprämenstruellen Veränderungen des Endometriums, zur Sekretionsphase. Tritt Schwangerschaft ein, so bleiben die vermehrte Produktion von Prolan B und Corpus-luteum-Hormon bestehen und die prägravide Schleimhaut geht in die eigentliche Schwangerschaftsdezidua über, bleibt jedoch die Eieinbettung aus, so bildet sich das Corpus luteum zurück, die Schleimhaut stößt sich ab — die Menstruation tritt ein.

Nun darf man sich aber nicht vorstellen, daß das Follikelhormon erst von der Pubertät ab im weiblichen Körper kreist: Schon Jahre vor der ersten Menstruation beginnend und bis zum Schlusse der Geschlechtsreife fortreichend, gelangt ein in der Stärke mehr oder weniger wechselnder Strom von Follikelhormon ins Blut, das in den zahlreichen kleinen Follikeln der Ovarien dauernd gebildet wird. Diese Funktion der Keimdrüsen bezeichnen wir nach Schröder als die vegetative Funktion, zum Unterschied von der die oben beschriebenen prämenstruellen Schleimhautveränderungen bewirkenden generativen Funktion. Diese vegetative Funktion bringt vom 8.—10. Lebensjahr an den in den

ersten Kindheitsjahren unverändert klein gebliebenen Uterus, sowie Tuben und Vagina, auch das äußere Genitale zum Wachstum und erhält bei dem herangereiften Weibe die Gebärmutter in ihrer Größe und ihrem Turgor. Sie ist also verantwortlich für die Entfaltung und Erhaltung des Uterus als Brutraum und als Gebärorgan. Unter ihrem Einfluß entwickelt sich aber auch das Becken zu der für die Geburt einzig günstigen, typisch weiblichen Form und Größe, entfalten sich die der einzig natürlichen Ernährung des neugeborenen Kindes dienenden Brustdrüsen.

Gestützt auf diesen Einblick in die wichtige Rolle des Follikelhormons liegt es nahe diesen als so bedeutungsvoll erkannten Faktor in unsere Therapie einführen und jeglichen Mangel an Follikelhormon durch Zufuhr eines, dem Follikelhormon auch chemisch gleichwertigen Präparates auszugleichen, wie es im Progynon zur Verfügung steht.

Das häufigste Anwendungsgebiet der Hormontherapie ist die Amenorrhoe; auch ich habe neben einigen Oligo-Hypomenorrhoeen vor allem Amenorrhoeen zu beeinflussen versucht, denn das Ausbleiben der Menstruation ist oft das augenfälligste und früheste Symptom gestörter Ovarialfunktion bzw. einer Störung des gesamten endokrinen Systems überhaupt. Und wenn auch die Wiederhervorrufung der Menstruation eigentlich nicht das Hauptziel der Behandlung darstellt, so ist sie doch der Indikator dafür, daß das endokrine Gleichgewicht im Organismus wiederhergestellt ist, besonders auch im Hinblick auf die Funktion der Hypophyse.

Das Behandlungsschema gestaltete sich bei Amenorrhoeen fast durchwegs der Art, daß der betreffenden Patientin in den ersten 14 Tagen 5 mal 10000 oder 5 mal 50000 Internationale Benzoateinheiten des Progynon B oleosum intramuskulär injiziert wurden, abhängig von der Dauer der Amenorrhoe, dem Zeitpunkt der Menarche und der Stärke und Dauer der früheren Blutungen. Aus den verschiedenen derartigen Angaben suchte ich mir zusammen mit dem Gesamteindruck, den die Frau bot und nach Ausschluß endokriner Störungen anderen Ortes, ein ungefähres Bild von ihrem Hormonhaushalt zu machen und danach richtete ich mich mit der Höhe der verabreichten Hormondosen. Während der nächsten 14 Tage wurde nun abgewartet, ob nach dieser Zeit ein wenn auch geringer Blutabgang ans den Genitalien eintrat. War dies der Fall, so

bekam die Frau nach Aufhören der Blutung wieder 14 Tage lang die betreffende Progynondosis, mit welcher ich dann je nach Erfolg bei jeder neuen Kur ein wenig zurückging und zwar dann, wenn die eintretende Periode an Regelmäßigkeit, Dauer und Stärke sich einer normalen immer mehr anglich. Trat jedoch nach 2 mal 14-tägiger Progynonbehandlung und dazwischen liegender 14-tägiger Pause keine Blutung ein, so schien mir dies auf noch größere Minderwertigkeit hinzudeuten, derart, daß die Progynongaben nicht instande waren Luteinisierung des gesprungenen Follikels hervorzurufen. Dann verabreichte ich vom 17. bis 21. Tag je eine Injektion von Proluton und versuchte hier mit möglichst niedrigen Dosen auszukommen. Meist hatte diese kombinierte Behandlung dann den Erfolg, daß ich beim nächsten Cyclus mit Progynon allein auskam.

Bei Oligo- und Hypomenorrhoeen kann man schlecht schematisieren, jeder Fall weicht in irgendeiner Hinsicht vom anderen ab. Jedenfalls versuchte ich hier immer mit kleineren Mengen und mit Progynon allein auszukommen. Ich richtete mich in diesen Fällen immer nach den geklagten Beschwerden wie Kopfweh, Augenflimmern, Erbrechen und Kreuzschmerzen. Vor allem war ich darauf bedacht den vorhandenen Cyclus in der Regelmäßigkeit des Ablaufs nicht zu stören und gab Progynon immer nur in der ersten Cyclushälfte. Während ich verschiedene Patientinnen mehrere Monate hindurch behandeln konnte und so auch den entsprechenden Erfolg buchen kann, war es mir leider bei anderen nur möglich einen Cyclus zu beeinflussen. Die betreffenden Frauen waren meist Selbstzahlerinnen von auswärts, die während einer 4-wöchigen Wärmebehandlung auf Station der Progynontherapie sehr zugänglich waren, dann aber Kosten und Reisebeschwerden scheuten und nicht wiederkamen.

Amenorrhöische Patientinnen.

1. Pat. H., 21 jähriges Mädchen von kleinem, ziemlich kräftigen Körperbau. Starker Fettansatz, blasse Haut, Lippenbärtchen.

Anamnese: Menarche mit 15 Jahren, regelmäßige Blutung alle 4 Wochen 4—5 Tage dauernd, ziemlich stark, ohne besondere Beschwerden. Seit Mai 1934 Blutungen ausgeblieben, seitdem dauerndes Druckgefühl im Leib und Stechen in der Rückengegend. Zeitweise starkes Erbrechen. Obstipation.

Gynäkologischer Befund: Vagina eng, Portio schlanker, virgineller Zapfen. Muttermund grubchenförmig, sieht nach unten. Uterus in Streckhaltung, leicht anteflektiert, dextrovertiert, fixiert. Linke Adnexe anscheinend frei. Rechte Adnexe zu einem kleinhühnereigroßen Tumor verbacken, druckempfindlich. Das rechte Parametrium ist geschrumpft, links weich.

Diagnose: Alte Adnexitis, sekundäre Amenorrhoe.

Behandlung: Neben sonstiger konservativer Behandlung

21. 10. 1935	Injektion von 50 000 IBE. Progynon B oleosum,
24. 10. 1935	" " 50 000 " " "
28. 10. 1935	" " 50 000 " " "
29. 10. 1935	Untersuchung: rechts über daumendicker, etwas geschlängelter Tuboovarialtumor, der kaum noch druckempfindlich ist.
31. 10. 1935	Injektion von 50 000 IBE. Progynon B, oleosum,
9. 11. 1935	" " 50 000 " " "
12. 11. 1935	Tumor nicht mehr zu tasten.
18. 11. 1935	Geringe Blutung aus der Vagina, wegen deren Geringfügigkeit weiterhin am
19. 11. 1935	Injektion von 50 000 IBE. Progynon B oleosum.
Am 23. 11. 1935	abends wieder geringer Blutabgang.
Am 26. 11. 1935	tritt starkes Nasenbluten auf.
Am 28. 11. 1935	Luteogantabletten, abends Einsetzen einer ordentlichen Blutung. Der erste Blutabgang trat am 28. Tag nach der ersten Progynon- injektion ein.

Ergebnis: Nach 1½ jähriger Blutungspause tritt erstmalig wieder eine, wenn auch etwas verzögerte Blutung aus der Gebärmutter auf, das dauernde Druckgefühl im Leib und Rückenstechen ist während der Behandlung verschwunden, kein Erbrechen mehr. Die Patientin drängt nach

diesem Erfolg nach Hause entlassen zu werden, deshalb ist keine weitere Progynonbehandlung möglich.

2. Pat. Kü., 32jährige adipöse Frau. Seit 1929 verheiratet.

Anamnese: Menarche mit 14½ Jahren. Blutungen meist regelmäßig, alle 4 Wochen, 4—5 Tage dauernd, mittelstark. Seit der Verheiratung waren die Blutungen im Intervall immer regelmäßig. Es kam aber vor, daß einmal im Jahr eine Pause von 6 Wochen eintrat. Keine Schmerzen. Seit Sept. 1933 blieb die Regel ganz aus, keine Unterleibschmerzen, kein Ausfluß. Vor 6 Wochen im Gesicht Furunkel, jetzt einen zweiten.

Gynäkologischer Befund: Vulva geschlossen, Nullipara deflorata, Vagina eng, nicht besonders lang. Portio virgineller Zapfen. Muttermund geschlossen, grubchenförmig, sieht etwas nach vorn. Corpus uteri knapp kastaniengroß, etwas anteflektiert. Rechts im Douglas etwas schmerzhaftere Resistenz, möglicherweise Ovar. Linke Adnexe frei.

Perturbatio: Links nicht sichere Durchtrittsgeräusche, rechts sichere D.

Diagnose: Sterilität bei Hypoplasia genitalis, sekundäre Amenorrhoe, alte Adnexitis.

Abrasio am 6. 7. 1934. Sondenlänge 6 cm, geht nach vorne, Dilatation bis Hegar 8. Cavum nicht besonders weit. Kaum Schleimhaut zu gewinnen. Mikroskopischer Befund: kleine Bröckel ruhender Schleimhaut. Nur Epithelbänder, einzelne Drüsen.

Hormonbehandlung mit Progynon B oleosum: 1., 4., 8. und 15. 7. 1934 je 50 000 IBE. 21., 22., 23. und 24. 7. 1934 je 2 KE. Lutren.

Am 29. 7. 1934 beginnt Pat. leicht zu bluten, also am 28. Tag nach der ersten Progynoninjektion.

In den nächsten Tagen wird die Blutung stärker und dauert bis zum 1. 8. 1934 an. Sondenlänge des Uterus jetzt 6½ cm.

Ergebnis: Normal starke Blutung aus dem Uterus zum richtigen Termin ohne Beschwerden. Geringes Wachstum des Uterus.

3. Pat. St., Erbhofsbäuerin, 34 jährige, mittelgroße, kräftige Frau, mit frischen roten Wangen und Lippenbärtchen.

Anamnese: Menarche mit 15—16 Jahren. Blutungen unregelmäßig, alle 3—6 Wochen, 5—8 Tage dauernd. Seit 1926 verheiratet. Hat 3 Spontangeburt und 2 Aborte durchgemacht. Seit der letzten Geburt im Mai 1934, also seit $1\frac{3}{4}$ Jahren keine Regelblutung mehr, manchmal rheumatische Schmerzen im rechten Oberschenkel und Hüftgelenk, sowie im linken Arm.

Gynäkologischer Befund am 2. 1. 1936: Vorderer und hinterer mäßiger Descensus vaginae. Pseudoerosion an der hinteren Muttermundlippe. Portio sehr klein. Uterus gestreckt, sehr klein, retrovertiert. Rechts sehr kleines Ovar, deutlich herauszutasten.

Diagnose: Sekundäre Amenorrhoe nach Partus.

Behandlung: mit Progynon B oleosum am 3., 6., 9., 12. und 15. 1. 1936 je 50 000 I.B.E., am 20., 21., 22. und 23. 1. 1936 je 2 KE. Proluton.

Am Nachmittag des 24. 1. 1936 tritt eine Blutung ein und hält in mittlerer Stärke $4\frac{1}{2}$ Tage bis zum 28. 1. 1936 an.

Entlassungsbefund am 30. 1. 1936: Pseudoerosion ziemlich abgeheilt. Portio mäßig umfänglich, Muttermund für Fingerkuppe durchgängig. Uterus antevertiert, ganz leicht anteflektiert. Corpus uteri knapp hühnereigroß. Rechtes Ovar klein, isoliert zu tasten. Linkes Parametrium etwas gespannt.

Ergebnis: Eintritt einer normalen Blutung ohne Beschwerden, Wachstum des hypoplastischen Uterus.

Die Patientin ist damit einverstanden, von auswärts zu kommen und sich ambulant Progynon spritzen zu lassen, um den regelmäßigen Menstruationszyklus wieder in Gang zu bringen.

Am 30. 1. und 1., 5., 9., 12. Febr. 1936 je 50 000 IBE. Progynon B ol. Daraufhin nach 3 wöchentlichen Blutungsintervall vom 18.—23. Febr. mittelfstarke Blutung ohne Beschwerden.

Nun Zurückgehen der Dosierung auf je 50 000 IBE am

26. 2. und 1., 2., 3., außerdem 30 Dragées à 1000 IE. verordnet in den ersten 14 Tagen zu nehmen.

Nach 3 Wochen blutet Patientin vom 11.—16. 3. mittelstark. Am 19. 3. 1936 noch einmal 50 000 Progynon B oleos und Dragées.

Nach 3 Wochen berichtet Patientin wieder eine normale Blutung vom 2.—7. 4. 1936.

Weitere Behandlung erscheint nun nicht mehr nötig. Patientin schreibt einige Male sehr dankbar, daß ihre Regel wieder völlig in Ordnung sei und die Blutung in normaler Stärke zum erwarteten Zeitpunkt einträte. Außerdem seien die früher geklagten Gelenksbeschwerden wie weggeblasen.

Ergebnis: Spontane Regulierung des Zyklus ohne weitere Hormonzufuhr.

4. Pat. K., 24jährige, ziemlich kleine Frau von schwächlicher Konstitution und blasser Hautfarbe.

Anamnese: Menarche mit 16 Jahren, Menses immer regelmäßig alle 4 Wochen, aber nur schwache 2—3 tägige Blutung bis 1932. Im ersten halben Jahre 1933 noch eine normale Blutung, dann wurden diese immer unregelmäßiger und schwächer. Manchmal hatte Patientin Wallungen.

Befund: Vagina mittelweit, Portio schlanker Zapfen, Mm. grubchenförmig, geschlossen, sieht nach hinten. Uterus anteflektiert, klein, fingergliedgroß, von glatter Oberfläche, derber Konsistenz und guter Beweglichkeit. Adnexe und Parametrien beiderseits palpatorisch frei.

Diagnose: Sekundäre Amenorrhoe, Hypoplasia uteri.

Behandlung: im Jahre 1933 stationäre Behandlung mit Ovarium-Panhormon und Agomensininjektionen.

Weiterhin keine Blutung und kleiner, hypoplastischer Uterus. Als 1934 noch keine Besserung des Zustandes eingetreten ist, erstmalig Progynonkur. Injektionen von je 10 000 IBE. am 3., 6., 9., 16., 20., 23. und 30. Juni 1934. Daraufhin zeigt sich am 30. 6. 1934 Blutabgang aus dem Uterus, der 3½ Tage anhielt. In der folgenden Woche noch einmal 3 tägige Blutung, darnach erscheint Patientin nicht mehr.

Am 9. 9. 1935 kommt sie erneut in die Sprechstunde

mit der Angabe seit der damaligen Blutung 1934 keine mehr gehabt zu haben. Sie klagt über Kreuzschmerzen bei Anstrengungen und Jucken am ganzen Körper.

Befund im wesentlichen unverändert, hingegen erscheint der Uterus, der leztthin kleinfingergliedgroß war, größer, jetzt taubeneigroß.

Patientin wird jetzt regelmäßig mit Progynon behandelt. Injektionen von je 10 000 IBE Progynon Boleos. am 7., 11., 14., 18., 21., 25., 28., 11., 2. und 5. 12. 1935. Am 6. 12. Corpus luteum Hormon 2 KE.

Daraufhin vom 10.—14. 12. 1935 ausgiebige Blutung der Patientin bei sonstigem Wohlbefinden. Es werden 4 Wochen abgewartet, ob spontan Mitte Januar 1936 eine Blutung eintritt. Dies ist nicht der Fall. Patientin klagt um diese Zeit über Müdigkeit, wird erneut mit Progynon gespritzt. Auf 8 mal 10 000 IBE. vom 16.—31. Januar blutet Patientin vom 8.—10. 2. in normaler Stärke und hat keinerlei Beschwerden zu klagen. Zurückgehen mit der Dosierung auf 3 mal 10 000 IBE. vom 21.—26. 2. mit dem Erfolg, daß Patientin am 5. 3. eine 1 tägige Blutung hat. Dies zeigte mir, daß ich etwas zu wenig Hormon gegeben hatte. Beim nächsten Mal insgesamt 5 mal 10 000 IBE. vom 10.—18. 3. Danach blutet Patientin normal vom 27.—30. 3. Weiterhin auf 4 mal 10 000 IBE. vom 1.—8. 4. 1936 normale, schmerzlose Blutung vom 16.—19. 4. 1936, auf 3 mal 10 000 IBE. vom 22.—29. 4. 1936 Blutung vom 7.—9. 5., auf wieder 3 mal 10 000 IBE. Blutung vom 28.—30. 5., auf weitere 3 Injektionen zu 10 000 IBE. vom 8.—12. 6. blutet Patientin regelmäßig zum rechten Termin weiter und spontan in dieser Art bis heute. Dabei sind die Blutungen von normaler Stärke und Dauer und vollkommen schmerzlos. Außerdem sind die lästigen Kreuzschmerzen und das Hautjucken vollkommen verschwunden.

Ergebnis: Die schwächliche, leicht kränkelnde Patientin, deren hartnäckige Amenorrhoe durch keine Mittel zu beheben war, ist durch Progynonkuren wieder vollwertige Frau mit spontanen periodischen Blutungen geworden und befindet sich jetzt in gutem körperlichen Gesamtzustand.

5. Pat. E., 23 jähriges kräftiges, etwas dickliches Mädchen mit gesunder roter Hautfarbe.

Anamnese: Menarche mit 15 Jahren, Blutung alle 4 Wochen regelmäßig, 5 Tage lang, ziemlich stark. Letzte Blutung vor einem Jahr am 8. 1. 1935. Patientin klagt über Übelkeit. Keine Geburt, kein Abgang. Keine Beschwerden im Unterleib. Stuhlgang angehalten.

Gynäkologischer Befund: Vagina eng, kleine Portio, Uterus kaum fingergliedgroß, sinistroponiert.

Diagnose: Hypoplasie, sekundäre Amenorrhoe.

Hormonbehandlung mit Progynon B oleosum. Injektionen zu 10000 IBE. am 6., 9., 12., 15., 18. 1. 1936. Am 23. 1. 2 KE. Proluton.

Nachmittags setzt am 23. 1. Blutung ein und dauert bis 26. 1. an.

In den nächsten 4 Wochen versäumt Patientin leider die Behandlung und blutet daher auch nicht. Sie kommt dann im Februar wieder und erhält am 25., 28. 2., 2., 5., 9. 3. je 10000 IBE. und blutet daraufhin vom 17.—20. 3. 1936 in normaler Stärke und ohne Beschwerden. Am 24., 27. 3. und 1. 4. 1936 je 10000 IBE. und daraufhin normale Blutung vom 9.—12. 4. 1936. Am 16. 4. einmal 50000 IBE., Blutung vom 5.—8. 4. in gewohnter Stärke. Dann am 11., 13., 16., 18. 5. je 10000 IBE. Progynon, Blutung Anfang Juni ohne jede Beschwerden. Patientin blutet seitdem spontan weiter in regelmäßigen 3½ wöchigen Intervallen und fühlt sich sehr wohl in jeder Hinsicht.

Ergebnis: Hervorrufen spontaner Regelblutungen nach mehrmonatiger Progynonbehandlung. Keine Übelkeit mehr.

6. Pat. Schm., ziemlich kleine, ganz kräftige junge Frau in guten Ernährungszustand und gesundem Aussehen. 32 Jahre alt.

Anamnese: Menarche mit 15 Jahren, Blutung regelmäßig alle 28 Tage 4 Tage lang anhaltend, ohne Beschwerden. 1930 hatte sie eine Spontangeburt, 7 Wochen danach blutete sie wieder und von nun ab alle 3 Wochen regelmäßig und ohne Beschwerden, aber stärker und 6 bis 7 Tage lang. Im Juli und August 1932 Blutungspause, dann

blutete sie wieder regelmäßig alle 4 Wochen bis zum Frühjahr 1933. Doch litt sie vom Herbst 1932 bis Sommer 1933 an weißem Ausfluß. Seit Frühjahr 1933 blutet Patientin überhaupt nicht mehr, nur eine schwache Blutung im Herbst 1933, seitdem endgültig amenorrhöisch. In den Jahren 1932 bis 1934 litt Patientin oft an starken Kopfschmerzen und Schwindelgefühl. Alle 4 Wochen verspürte sie leichte krampfartige Schmerzen im Unterleib, sodaß sie immer meinte, die Regel müsse kommen, ist jedoch nie eingetreten.

Gynäkologischer Befund: Äußeres Genitale normal, Portio steht mittelhoch, schlank, Mm. quergepalten, sieht nach vorne unten. Uterus retrovertiert, anscheinend etwas retroflektiert. Corpus klein, aber in seiner ganzen Größe herauszutasten. Im linken Parametrium alte Narbenzüge.

Diagnose: Sekundäre Amenorrhoe.

Behandlung: Patientin erhält auf Station Hormonbehandlung, kombiniert mit einer Wärmebehandlung. Am 18., 23., 28. 12. 1925, 2. und 4. 1. 1936 Injektionen von je 50 000 IBE. Progynon B oleosum. Am 8., 9. und 10. 1. 1936 je 2 KE. Proluton. Hierauf reagiert Patientin mit heftigem Nasenbluten, was sie sonst nicht gekannt hat. Am 28. 1. 1936 erneut 50 000 IBE. Progynon B oleosum, Patientin will jetzt ambulant zur Behandlung kommen und erhält noch 30 Dragées à 1000 IE. zum Einnehmen. Am 2., 5., 9. und 12. 3. weitere Spritzen von der alten Dosierung. Daraufhin berichtet die früher ganz verzweifelte Patientin, daß sie am 20. 2. 1936 einen Tag ganz richtig geblutet habe.

Auf neuerliche Injektionen am 26. 2. von 10 000 IBE., am 2., 5. 3. von je 50 000 IBE. Progynon und 30 Dragées à 1000 IE. bekommt Patientin nach Ablauf von 3 Wochen eine normale 4 tägige Blutung vom 12.—15. 3. 1936. Wegen momentanen Mangels an 50 000 IBE. erhält Patientin in neuer Kur nur 2 mal je 10 000 IBE. am 17. u. 20. 3. und kann sich nun nach diesem schönen Blutungserfolg nicht mehr entschließen, die Bahnfahrt öfter zu machen. So bekommt sie natürlich zu wenig Hormoneinheiten und die Folge ist, daß sie in dem nächsten Brief klagt nicht mehr geblutet zu haben.

Auf zugeschiedte Dragées à 1000 IE. und 2000 ME. ebenfalls kein Erfolg. Am 26. 5. erscheint Patientin wieder tieftraurig bei mir und möchte von neuem behandelt werden, kann jedoch nicht so oft, wie es unumgänglich nötig wäre zum Injizieren kommen. Hierauf gab ich ihr 5 mal 50 000 IBE. Progynon mit nebst Anweisung zum Spritzen für die Gemeindegemeister. Danach meldet mir Patientin, daß sie wieder Nasenbluten gehabt habe. Dies war für mich ein Zeichen, daß der ganze schöne Blutungserfolg, den ich gehabt hatte, wieder rückgängig geworden war und man wieder von vorne anfangen mußte. Jedoch war mir die Behandlung draußen ohne jede ärztliche Kontrolle zu gefährlich, zum regelmäßigen Herfahren konnte sich die in nicht gerade guten pekuniären Verhältnissen lebende Frau wegen vieler dringender landwirtschaftlicher Arbeiten nicht entschließen und so unterblieb alles. Erst jetzt geht Patientin mit neuem Eifer an die Behebung ihrer Erkrankung und ich beginne eben mit einer neuen Hormonbehandlung, zu welcher die Frau eifrig und regelmäßig kommen will.

Ergebnis: Nach genügenden Progynongaben gelang es mir bei der sehr pessimistischen Patientin eine normale Blutung herbeizuführen, die unbedingt notwendige Weiterbehandlung bis zum vollen Erfolg, dem Auftreten spontaner Regelblutungen, war aus äußeren Umständen nicht durchzuführen, wird jedoch jetzt erneut in Angriff genommen.

Auf 5 mal 50 000 IBE. Progynon B oleosum und 4 mal 0,5 mg Proluton hat Patientin 4 Wochen nach der ersten Injektion 1 Tag mittelstark geblutet. Die Behandlung geht weiter.

7. Pat. Sa., sehr kräftiges Mädchen mit starker Adipositas, aber von frischem, gesunden Aussehen. 27 Jahre alt.

Anamnese: Menarche mit 14 Jahren, Blutung anfangs sehr stark, immer regelmäßig, in Zwischenräumen von 14 Tagen bis 10 Wochen, 8 Tage lang, dabei etwas Rückenschmerzen. Seit Februar 1933 keine Blutung mehr. Da Behandlung mit Preloban, Agomensin und Diathermie bisher erfolglos, Aufnahme zur stationären Behandlung. In den letzten 1½ Jahren hat Patientin ungefähr 40 Pfund zugenommen.

Gynäkologischer Befund: Linea alba besonders unterhalb des Nabels behaart. Behaarung des Mons greift bis auf die Analgegend über. Vagina mittelweit, Portio virgineller Zapfen, Mm. geschlossenes Grübchen. Uteruskörper derb, retroflektiert, gut kastaniengroß.

Abrasio: Sonde 7 geht nach hinten, Wände mäßig derb, glatt fast keine Schleimhaut. Mikroskopischer Befund: Ruhende Schleimhaut.

Diagnose: Sekundäre Amenorrhoe, bei Hypoplasia genitalis. Hyperthyreoidismus, Anzeichen eines Habitus virilis. Retroflexio uteri.

Behandlung: Vom 8.—22. 5. 1934 5 Injektionen von je 50 000 IBE. Progynon oleosum, vom 26.—30. 5. Corpus luteum. Am 31. 5. tritt in der Nacht eine Blutung ein. Nach vorsichtiger Dilatation des stark kontrahierten inneren Muttermundes (ohne Narkose) wird mit einem Kürettenstrich ein kleines Schleimhautstückchen zur Untersuchung entfernt Sondenlänge jetzt 8.

Es ist also durch die Hormonbehandlung nicht nur zum Auftreten einer Blutung, sondern auch zu einem deutlichen Uteruswachstum gekommen.

Am 5. 6. 1934 Schluß der 5 tägigen Blutung (12 Binden). Am 6. 6. erhält Patientin noch einmal 50 000 IBE. zur Anregung des Schleimhautwachstums, dann wird die Behandlung leider abgebrochen.

Im Januar 1936 kommt Patientin zu mir mit neuerlichen Klagen, daß sie nicht blute. Ich beginne mit einer neuen Progynonkur. Injektionen von je 50 000 IBE. am 27. u. 30. 1. 1936, 2., 5. u. 9. 2. 1936. Daraufhin blutet sie prompt vom 17.—23. 2. 1936 ohne Beschwerden. Auf je 50 000 IBE. Progynon, am 27. 2. u. 2., 6., 3. 1936 normale Blutung vom 16.—20. 3. Am 1. 4. 50 000 IBE. Progynon, darauf blutet Patientin vom 8.—11. 4. ohne Beschwerden ganz normal. Nun verjäumt sie einmal die Behandlung und blutet nicht spontan, ein Zeichen dafür, daß ihr Hormonspiegel noch nicht die nötige Höhe erreicht hat. Auf neuerliche je 50 000 IBE. am 19., 22. u. 25. 5., Blutung in alter Stärke vom 3.—9. 6. Am 15. u. 17. 6. je 50 000 IBE.

Blutung vom 1.—5. 7., dann Ende Juli 1936 auf einmal 50 000 IBE. und vom 24.—28. 8. auf einmal 50 000 IBE. normal ohne Schmerzen geblutet. Seitdem spontan regelmäßige Blutungen. Außerdem ist Patientin dünner geworden (Gewichtsabnahme) und fühlt sich viel wohler als früher.

Ergebnis: Durch systematisch durchgeführte Progynonbehandlung Auftreten spontaner Regelblutungen, Wohlbefinden und Gewichtsabnahme der adipösen Patientin.

8. Pat. Por., kleine nervöse Frau, 26 jährig, mit vermehrtem Fettpolster.

Anamnese: Menarche mit 15 Jahren, Blutung immer regelmäßig alle 28 Tage, 3—4 Tage dauernd, wenig Blutverlust, mit geringen Schmerzen verbunden. Im Januar 1933 machte sie einen kriminellen Abort durch, seitdem keine Blutung mehr aufgetreten. Alle 4 Wochen bekommt Patientin stark ziehende Schmerzen im Kreuz, die 3—4 Tage anhalten, gleichzeitig tritt geblicher Ausfluß auf. Außerdem treten in dieser Zeit starke Kopfschmerzen auf. Patientin leidet unter Verstopfung.

Gynäkologischer Befund: Bauchdeckenstraff, ziemlich fettreich, ganzer Unterleib druckempfindlich, keine Resistenzen tastbar. Vulva klappt etwas, Scheideneingang weit, leichte Senkung der vorderen Vaginalwand. Vagina weit, Portio zapfenförmig, Mm. geschlossener Querspalt, sieht nach vorne. Uterus anteflektiert, druckempfindlich, etwas weich, von normaler Größe. Portiooberfläche glatt, etwas weißlicher Fluor. An der Grenze der hinteren Muttermundslippe zum hinteren Scheidengewölbe befindet sich ein Narbenstrang. Douglas verkürzt und druckempfindlich. Linkes Parametrium strangförmig verkürzt besonders im vorderen Drittel. Ligg. sacrouterin. verkürzt und druckempfindlich.

Grundumsatzbestimmung, welche wegen des nervösen Wesens der Patientin vorgenommen wird, ergibt einen etwas erhöhten Wert von + 13 %.

Diagnose: Sekundäre Amenorrhoe nach kriminellen Abort.

Behandlung: Patientin wird auf Station verlegt und es wird darangegangen mit Progynon B oleos. die atro-

phische Schleimhaut des Uterus wieder aufzubauen. Je 1000 IBE. werden am 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 2. 1936 intramuskulär injiziert. Am 20. 2. 1936 50000 IBE., dann abwarten, ob Patientin auf diese Therapie mit einer Blutung antwortet. Nachdem ich 4 Wochen bis zum 4. 3. 1936 gewartet habe, ohne daß diese eintritt, führe ich weiter Progynon zu, kombiniere aber diesen mir komplizierter erscheinenden Fall mit Proluton in der Art, daß ich am 4., 7. und 10. 3. je 50000, am 13. und 16. 3. je 10000 IBE. Progynon B oleos. und am 23., 24., und am 25. 3. 1936 je 20 KE. Proluton gebe. Auf diese energische Behandlung tritt Anfang April eine sehr starke, über 8 Tage anhaltende Blutung ein, bei welcher sich die an und für sich empfindliche Patientin sehr abgeschlagen und müde fühlt. Diese Erscheinungen geben sich jedoch wieder und Patientin hat jetzt ohne jede weitere Hormon- oder sonstige Behandlung in jeden Monat ihre regelmäßige, normal starke Menstruation ohne jegliche Beschwerden.

Ergebnis: Auf kombiniertem Progynon-Proluton Behandlung Auftreten einer starken Blutung und seitdem regelmäßige spontane Menstruationsblutungen. Patientin fühlt sich auch ruhiger und ist nicht mehr so aufgeregt, keine Kopfschmerzen mehr.

9. Pat. Fu., seit 1928 verheiratete 27 jährige Patientin.

Anamnese: Menarche mit 15 Jahren, Menjes alle 28—30 Tage, manchmal auch 4 oder 5 Tage darüber, mittlerer Blutverlust mit ziemlichen Schmerzen verbunden. 1928 und 1929 2 normale Geburten, 1934 Fehlgeburt im 3.—4. Monat, Patientin wurde ausgeschabt und war nach 5 Tagen wieder hergestellt. Nun kommt sie mit der Angabe, daß sie seit diesem Abort 1934 nur einmal im September 1935 3—4 Tage mittelfark geblutet habe, von da ab traten zeitweise Kreuzschmerzen auf, die in beiden Leisten gegenden ausstrahlen. Außerdem habe sie seit der Fehlgeburt an Gewicht stark zugenommen, leide hie und da an Schwindelanfällen und von Zeit zu Zeit unter starkem Haarausfall.

Gynäkologischer Befund: Reichliche Adipositas Leib weich. Vagina mittelweit, Portio klobig, Mm. quergespalten,

für Fingerkuppe einlegbar. Uterus retroponiert, Uteruskörper anscheinend retroflektiert, aber durch die reichliche Adipositas nur sehr schwer herauszutasten. Portio besonders an der unteren Muttermundslippe etwas livide, etwas vermehrte Absonderung. Adnexe o. B., Parametrien frei.

Eine Kontrolluntersuchung in Narkose ergibt einen retroflektierten Uterus, welcher nicht vergrößert ist.

Die Gasstoffwechseluntersuchung ergibt eine Abweichung von + 21%.

Diagnose: Sekundäre Amenorrhoe seit Juni 1934 (Abort mit nachfolgender Auschabung) mit einer Blutung im September 1935.

Behandlung: Am 11. und 14. 4. 1936 Injektionen von je 50 000 IBE. Progynon B oleos. Am 16. zeigt sich ein geringfügiger Blutabgang. Vom 17. 4. ab täglich 2 Drageés à 2000 ME. Progynon und 3 Tabletten Preloban. Nachdem sich am 18. 4. wieder etwas Blut zeigt, tritt am 19. 4. eine normale Blutung ein, welche 5 Tage anhält.

Ergebnis: Normale Blutung auf Progynoninjektionen hin. Der verhältnismäßig rasche Erfolg ist wahrscheinlich durch die nicht lange dauernde Amenorrhoe zu erklären.

Seit der Behandlung spontane Menfes.

10. Pat. Schä., mittelgroße 25 jährige Patientin von gutem Kräfte- und Ernährungszustand.

Anamnese: Menarche mit 16 Jahren, Blutung alle 4 Wochen, 4—5 Tage dauernd, aber sehr schwach, letzte am 14. 5. 1930. Nach einem Jahr nur einmal geringer Blutabgang. Patientin kommt jetzt, nachdem sie 6 Jahr nicht geblutet hat und klagt über Hitze im Kopf, Magenbeschwerden und rheumatische Schmerzen. Stuhlgang und Wasserlassen in Ordnung.

Gynäkologischer Befund: Straffe Bauchdecken nicht druckschmerzhaft, erbsengroße Leistendrüsen beiderseits, Druckschmerzhaftigkeit in der Magengegend. Vagina kurz, Portio tief, mehr nach links gerichtet, etwas nach links verzogen. Uterus ganz klein, anteflektiert, Parametrien und Adnexe frei.

Dianose: 6 Jahre bestehende sekundäre Amenorrhoe, Hypoplasie.

Behandlung: Hormonbehandlung mit großen Mengen, und zwar Injektionen von je 50 000 IBE. Progynon B oleos. am 18., 21., 24., 27. u. 30. 7., am 1., 4., 7. u. 10. 8. 1936. Durch diese Dosen von insgesamt 450 000 IBE. Progynon gelingt es den während der 6 Jahre atrophisch gewordenen Uterus zum Wachsen zu bringen und außerdem seine Schleimhaut in Funktion zu setzen. Am 15. 8. hat Patientin eine normal starke, 3 Tage dauernde Blutung bis zum 18. 8. Nach zwei weiteren Injektionen am 19. und 26. 8. kommt Patientin nicht mehr zur Behandlung und ist auch nicht mehr zu erreichen, da sie von auswärts ist.

Ergebnis: Nach 6 jähriger Amenorrhoe durch alleinige Progynonzufuhr normale Menstruation, gleichzeitig führte die Hormonbehandlung zum Waditum des sehr geschrumpften Uterus.

11. Pat. Neu., mittelgroße, ziemlich kräftige Frau, 23 Jahre alt.

Anamnese: Nach einer normalen Geburt am 11. 5. 1934 wurde bei ihr wegen Placentarretention und nachfolgender profuser lebensbedrohender Blutung eine Abrasio nötig. Am 13. 11. 1934 kommt Patientin in die Sprechstunde, da sie seitdem nicht wieder geblutet hat.

Befund vom 13. 11. 1934: Vagina weit, Portio kleiner Zapfen, Mm. grübchenförmig, sieht nach unten. Uterus klein, daumenendgliedgroß, anteflektiert, Adnexe und Parametrien frei Verordnung: Prelobantabletten.

Diagnose: Sekundäre Amenorrhoe post partum.

Am 18. 1. 1935 kommt Patientin erneut mit der Klage, daß sie immer noch nicht blute und außerdem bemerke, daß sie dicker werde.

Verordnung: Agomensintabletten.

Als auch daraufhin bis 5. 2. 1935, also dreiviertel Jahr nach der Niederkunft noch keine Regelblutung eingetreten ist, wird eine energische Hormonbehandlung vorgenommen. Anweisung an ihren Arzt von auswärts der Frau Progynon B oleos. in hohen Dosen zu injizieren.

Am 23. 4. 1936 erscheint Patientin neuerlich, aber unter wesentlich veränderten Umständen: auf die Progynonbe-

handlung hin habe sie in, wenn auch etwas unregelmäßigen Abständen ihre normale Periode bekommen. Die letzte sei im Dez. 1935 gewesen, seitdem fühle sie sich schwanger!

Gynäkologischer Befund: Bauchdecken sehr schlaff, handtellergroße Nabelhernie, Vagina ziemlich weit. Uterus anteфлекtiert, ungefähr kleinkindskopfgroß. Portio livide verfärbt.

Diagnose: Gravidität mens. 3—4.

Befund vom 19. 9. 1936: gravider Uterus liegt in der großen Bauchhernie, Herztöne rechts vom Nabel, rein. Kopf beweglich überm Beckeneingang, starke Kindsbewegungen. Niederkunft in ungefähr 14 Tagen.

Ergebnis: Spontane Geburt eines kräftigen Knaben am 6. Oktober 1936.

Oligo-Hypomenorrhöische Patientinnen.

12. Pat. He., 24jährige Landwirtsehefrau.

Anamnese: Menarche mit 17 Jahren. Menses nie regelmäßig. Nach der ersten Periode blieb sie ein halbes Jahr aus. Die Dauer betrug meist 4 Tage, vor allem war die Blutung außerordentlich schwach, Intervalle sehr groß. Im letzten Jahr (1933) hatte sie je eine Periode im Januar, Juni und die letzte am 23. 11. Keine Entbindung.

Gynäkologischer Befund: Portio kleiner Zapfen, kleine Erosin. Mm. grubchenförmig, rechte Adnexe etwas verdickt. Uterus anteфлекtiert, retroponiert. Äußeres Genitale hypoplastisch, ausgeprohen niedriger Muldendamm, Vagina für 1 Finger bequem durchgängig.

Diagnose: Hypoplasia genitalis, Fluor albus, primäre Sterilität, Oligohypomenorrhoe, Frigidität, (Ekzem an beiden Fußrücken).

Am 8. 2. 1934 ergibt die Uterusfondierung eine Länge von 6½ cm. Beginn der Hormonbehandlung mit hohen Dosen. Untersuchung am 19. 2.: Portio virgineller Zapfen, Uteruskörper anteфлекtiert, gut kastaniengroß, rechtes Ovar knapp mandelgroß, links nicht sicher gefühlt, Parametrien frei. Vom 8. 2. bis 10. 3. erhielt Patientin 5 mal 10 000 ME.

Follikulin-Menformon., 3 mal 10 000 ME. Progynon B oleos. und 4 mal 50 000 ME. Progynon und 5 mal 20 KE. Proluton.

Am 8. 3. wird eine sehr erfreuliche Gewichtsabnahme von 9 Pfund konstatiert, Patientin erfreut sich ausgezeichneten Wohlbefindens.

Am 10. 3. ergibt die Sondierung des Uterus eine Länge von 7½ cm.

Ergebnis: Uterus um 1 cm gewachsen, vom 12.—16. 3. 1934 hat Patientin 4 Tage geblutet, ausgiebiger Blutverlust. (Blutung 32 Tage nach der ersten Progynoninjektion.)

13. Pat. Teil., 15 jähriges ziemlich dickes Mädchen von blasser Hautfarbe.

Anamnese: Menarche mit 13 Jahren, Menfes ½ Jahr regelmäßig alle 4 Wochen von 7—8 tägiger Dauer mit starkem Blutverlust verbunden, keine Schmerzen. Das nächste ½ Jahr setzte die Blutung ganz aus, dann unregelmäßige Blutungen in Intervallen von 3—4—5 Wochen 1—2 Tage dauernd, sehr geringe Blutung. Seit ¼ Jahr dauernd ziehende Schmerzen im Unterleib, welche sich seit 10 Wochen verstärkt haben. Orale Medikation des behandelnden Arztes erzielte keine Besserung, letzte Periode am 18. 2. 1936 nur einen Tag. Stuhlgang angehalten.

Gynäkologischer Befund: Rectale Untersuchung: Hymenalring erhalten, Portio virgineller Zapfen, Mm. geschlossenes Grübchen, Uterus anteflektiert, etwas klein, derb, Adnexe frei, Parametrien rechts etwas verkürzt, nicht infiltriert, links frei.

Diagnose: Oligo-hypomenorrhoe, Hypoplasie, Fluor.

Behandlung: Auf je 2 KE. Proluton, verabreicht vom 25.—28. 3., ausgiebige Blutung am 28. und 29. 2., 1. und 2. 3. 1936, ohne Schmerzen. Progynonbehandlung mit je 10 000 IBE. am 4., 7., 10., 13. und 16. 3., Patientin blutet am 23. und 24. 3. normal ohne Beschwerden. Nun wieder je 10 000 IBE. Progynon am 25., 28. und 30. 3., 3. und 6. 4., Patientin geht dann nach Hause und berichtet von dort eine normale Blutung vom 19.—22. 4.

Ergebnis: Nach 4 wöchigem Intervall normale Blutung.

14. Pat. Vo., etwas blaßes empfindliches Mädchen von 23 Jahren, ziemliche Adipositas.

Anamnese: Menarche mit 12 Jahren, Menfes unregelmäßig, blieben ein Jahr ganz aus, dann alle viertel Jahre Blutung, dann wieder ein Jahr Pause, dann alle 14 Tage schwache Blutung. Jetzt alle 8—9 Wochen 7—8 tägige schwache Blutung, während der ersten 3 Tage starker Ausfluß. Seit Jahren Kreuz- und Leibschmerzen, weißer Ausfluß.

Gynäkologischer Befund: Vagina eng, Portio mittelgroß, Mm. grubchenförmig, geschlossen, Uterus anteflektiert, fast spitzwinkelig, Cervix sehr lang. Linkes Parametrium narbig verkürzt.

Diagnose: Hypoplasie mit Oligomenorrhoe.

Behandlung: Am 31. 12. 1935 mit 50000 IBE. Progynon Boleos. daraufhin vom 6.—8. 1. 1936 mittelstarke Blutung nach einem Intervall von 3 Wochen.

Befund am 11. 1.: Uterus anteflektiert, normale Größe und Konsistenz, Gewichtsabnahme der Patientin von 125 auf 118 Pfund. Hat jetzt in 14 Tagen 5 mal 10000 IBE. Progynon erhalten, geht nach Hause, berichtet eine normale Blutung vom 2.—4. 2. 1936. Außerdem Nachlassen des Ausflusses und Verminderung der Schmerzen.

Ergebnis: Mittelstarke Regelblutungen nach regelrechten Intervallen. Unzweifelhafte Aufmunterung der psychisch labilen Patientin. Gewichtsabnahme von 7 Pfund in 3 Wochen.

15. Pat. Vor., kleine 30 jährige, dicke Frau von kräftigem Körperbau.

Anamnese: Menarche mit 16 Jahren, Menfes regelmäßig alle 4 Wochen 2—3 Tage dauernd, ziemlich schwache Blutung. 1925 eine normale Geburt, kein Abgang. Seit der letzten Geburt Blutungen unregelmäßig, alle 6—12 Wochen, Dauer nur 1—2 Tage, sehr schwach. Kein Ausfluß. Patientin möchte gerne noch Kinder, letzte Blutung: am 10. 5. 1936.

Gynäkologischer Befund: Leib sehr starke Adipositas, etwas Hängeleib. Kleine Muttermundslippe, mehrere Ovula Nabothi, kleiner Mm. Uterus anteflektiert, Größe nicht sicher herauszutasten, aber jedenfalls nicht vergrößert. Adnexe beiderseits frei.

Diagnose: Oligo-hypomenorrhoe, sekundäre Sterilität.

Behandlung: Am 4. 6. 1936 verordnet Thyreoidin-tabletten, Preloban und Ovarium Panhormon. Am 24. 7. hat Patientin noch nicht wieder geblutet, klagt über Schmerzen im Kopf und Kreuz.

Befund: Vagina eng, kleine hochstehende Portio, Uterus anteflektiert, klein. Adnexe beiderseits frei. Nochmals dieselbe Verordnung.

Am 18. 8. noch keine Blutung aufgetreten (seit $\frac{1}{4}$ Jahr), manchmal Schwindelgefühl.

Befund: Portio sehr hochstehend, Uterus anteflektiert, etwas größer als früher. Im Spiegel kleine livide Verfärbung der Portio, leichte Erosion, schleimiger Fluor aus der Cervix. Verordnung: jeden 2. Tag 10 000 IBE. Progynon B oleos. und zwar am 19., 21., 23., 26., 28., und 31. 8. 1936. Daraufhin ziemlich starke Blutung vom 2.—6. 9. 1936, ohne Beschwerden. Nach einmaliger spontaner schwächerer Blutung weitere Progynonbehandlung.

Ergebnis: nachdem alle anderen Präparate weniger Erfolg bringen, treten nach Progynonbehandlung regelmäßige verstärkte Blutungen auf.

16. Pat. Voll., seit 1931 kinderlos verheiratete, junge Frau in gutem Kräftezustand, 30 Jahre alt.

Anamnese: Menarche mit 15 Jahren, Blutung alle 18 Tage 3—4 Tage dauernd, mittelfark, ohne besondere Beschwerden. Letzte Blutung vom 6.—10. 3. 1936. Vor drei Jahren blieb die Regel 2 mal aus, angeblich auf einen Motorradunfall hin, gleich danach starke 3 tägige Blutung (Abortus mens. 2?). Seit 1 Jahre Kreuzschmerzen und milchiger Ausfluß. Patientin möchte gerne Kinder haben.

Gynäkologischer Befund: straffe Bauchdecken, Vagina mittelweit, normale Absonderung, Portio zapfenförmig, in normaler Höhe, Mm. sieht nach vorne, geschlossenes Grübchen. Uterus anteflektiert, etwas klein. Adnexe frei, Lüftung schmerzhaft.

Diagnose: Sterilität, Hypoplasie.

Behandlung: Diathermie, hoher Progynonstoß.

Am 24. 3. 1936 Hormonstoß mit 100 000 IEB. Progynon

B oleos. Nächste Blutung nach 25 Tagen Intervall vom 21. 3. bis 2. 4. in normaler Stärke und ohne Beschwerden. Nach nochmaliger Verabreichung von 50 000 IBE. am 6. 4. geht Patientin in zuversichtlicher Stimmung nach Hause.

Ergebnis: Patientin schreibt jetzt, daß sie von ihrem Arzt weiter mit Progynon behandelt wurde und noch 10 Spritzen bekam. Sie fühle sich jetzt völlig von ihren Rücken[schmerzen befreit. Die Blutungen seien stärker wie früher und ganz ohne Beschwerden.

17. Pat. Fi.

Anamnese: Menarche mit 16 Jahren, Meneses alle 4 Wochen, schwache zweitägige Blutung. Seit einigen Jahren sind die Blutungen unregelmäßig alle 4—7 Wochen, dauernd 3—4 Tage nicht stark, letzte vor 3 Wochen am 13. 4. 1936. Kein Ausfluß, Wasserlassen und Stuhlgang o. B. Patientin ist seit 8 Jahren kinderlos verheiratet, möchte gerne Kinder.

Gynäkologischer Befund am 7. 5. 1936: Leib weich, nirgends druckempfindlich, Introitus geschlossen. Hintere Muttermundslippe Ovula Nabothi. Uterus anteflektiert, klein, Corpus höchstens daumengliedgroß, rechtes Parametrium etwas gespannt, sonst o. B.

Diagnose: Sterilität, Hypoplasie.

Verordnet: Ovarium Panhormon, Preloban und Thyroidin. Am 10. 6. berichtet Patientin, daß sie am 15. 5. geblutet habe, daß es ihr aber auf die Tabletten schlecht werde. Nächste Blutung vom 15.—18. 6. Befund im Wesentlichen unverändert. Die nächste Blutung tritt erst nach Ablauf von 7 Wochen am 2. 8. ein.

Beginn der Progynonbehandlung: je 10 000 IBE. Progynon am 25., 27. und 31. 8., 3. 9. Daraufhin vom 6. bis 9. 9. normal geblutet, ohne Beschwerden. Neuerdings je 10 000 IBE. Progynon am 10., 15., 17., 22. und 24. 9., ganz schmerzlose Blutung vom 3.—6. 10. nach 4wöchentlichem Intervall. Die Behandlung geht jetzt mehr stoßweise weiter, am 15. 10. eine Injektion von 50 000 IBE. Progynon.

Der Befund ergibt einen gegen früher deutlich vergrößerten Uterus.

Ergebnis: Wenn auch bis jetzt keine Schwangerschaft

zu melden ist nach der kurzen Behandlungszeit mit Progynon, so gibt doch die Vergrößerung der Gebärmutter Gewähr für einen vollwertigen Fruchthalter und ein kräftiges Gebärorgan.

18. Pat. Bä., Kräftige 29 jährige Frau mit leichter Facialisparese rechts.

Anamnese: Mit 13 Jahren bekam sie eine Facialisparese rechts, im Lauf der Zeit verlor sich diese wieder. Menarche mit 14 Jahren. Blutung alle 4 Wochen 3—4 Tage dauernd, sehr geringer Blutverlust. Bis zum Herbst 1935 starke krampfartige Schmerzen während der Regel, nach Abrasio verschwanden sie. Patientin kommt jetzt aus der Medizinischen Klinik, wo sie wegen starker Erkältung und Wiederauftretens der Facialisparese mit Wärme, Elektrisieren und Diathermie behandelt wurde. Seit einigen Monaten gelblicher Ausfluß, Stuhlgang leicht verhalten. Patientin ist seit 4 Jahren kinderlos verheiratet und kommt mit dem Wunsch nach Kindern in die Klinik. Letzte Blutung vom 15.—19. 4. 1936.

Gynäkologischer Befund: Leib virile Behaarung angedeutet. Vagina eng, Portio zapfenförmig, Mm. geschlossener Querspalt sieht nach vorne. Uteruskörper ante-flektiert, etwas sinistroniert, klein, hypoplastisch, kaum zu tasten. Etwas vermehrter gelblicher Fluor, Portiooberfläche glatt. Adnexe frei.

Diagnose: Sterilität, Hypoplasie.

Behandlung: Am 22. 4. 1936 Progynonstoß von 10000 IBE. Am 26. 4. 50000 IBE., dann fortlaufend täglich 3 Progynondragées à 2000 ME., um den Uterus zum Wachstum zu bringen.

Patientin wird mit Verordnung von Progynondragées entlassen und in 3 Monaten zur Nachuntersuchung wiederbestellt.

Nachuntersuchung am 10. 9. 1936: Patientin hat in der Zwischenzeit regelmäßig in den ersten 14 Tagen post menstr. 3 mal täglich 1 Dragée à 2000 ME. Progynon genommen. Sie hatte ihre Blutungen regelmäßig alle 4 Wochen ohne Unterleibschmerzen, letzte am 23. 8. 1936.

Befund: Portio schlank, Mm. grubchenförmig, Uterus anteflektiert, vielleicht noch etwas kleiner als normal, aber nicht mehr hypoplastisch. Adnexe und Parametrium frei.

Ergebnis: Noch keine Schwangerschaft, aber sehr wünschenswertes Wachstum des hypoplastischen Uterus zu fast normaler Größe. Regelmäßige Blutungen.

19. Pat. Schw., 33jährige Frau, reichliche Adipositas.

Anamnese: Menarche mit 15 Jahren, Meneses schon immer unregelmäßig alle 2—7 Wochen, nur 1—2tägige Blutung, sehr geringer Blutverlust.

Patientin ist schon seit einigen Jahren kinderlos verheiratet, möchte gerne Kinder.

Gynäkologischer Befund: Bauchdecken mäßig straff, ziemlich fettreich, Leib weich, nirgends druckempfindlich. Leistendrüsen, Pubes o. B., keine Bruchpforten. Vulva geschlossen, im Spiegel wenig weißlicher Fluor. Vagina mittelweit, Portio schlanker Zapfen, Mm. geschlossenes Grübchen. Uterus anteflektiert, Corpus klein, derb. Linkes Parametrium etwas gespannt, Adnexe frei, Douglas o. B.

Diagnose: Sterilität, Hypoplasie.

Behandlung: Mit Progynon B oleos. Beginn nach Ablauf einer ganz schwachen Blutung am 15. u. 16. 3. 1936. Injektionen von je 10000 IBE. am 21., 25. u. 27. 3. Ergiebige, beschwerdefreie Blutung nach 3wöchigem Intervall vom 3.—6. 4. Je 10000 IBE. am 9., 12. und 14. 4. Nach 3 Wochen normale Blutung vom 22.—25. 4. Neue Kur mit je 10000 IBE. am 28. und 30. 4. und am 2. 5. Seitdem hat Patientin in regelmäßigen Abständen normal starke Blutungen ohne Beschwerden gehabt.

Ergebnis: Verstärkte Blutung der früher minimalen Regelblutungen. Regelmäßige Intervalle. Patientin hat an Gewicht abgenommen und fühlt sich bedeutend frischer, sie erhofft jetzt, nachdem die Periode in Ordnung ist, sehnlichst eine Schwangerschaft.

20. Pat. Schau., kleine adipöse Frau von gesundem Aussehen, 38 Jahre alt.

Anamnese: Menarche mit 18 Jahren, etwa alle 4 Wochen sehr schmerzhaft Blutungen, Dauer oft nur einen Tag,

geringer Blutverlust. Keine Geburt, kein Abgang. In letzter Zeit waren die Blutungen so schwach, daß sie nun den Arzt auffucht. Während der Periode fühlt sie sich immer krank, unfähig zu jeder Arbeit. Sie muß sich hinlegen, klagt über starke Kopfschmerzen, Kreuzschmerzen, Schwindelgefühl und Augensjimmern. Patientin ist seit Jahren kinderlos verheiratet und wünscht sich trotz fortgeschrittenen Alters noch Kinder.

Gynäkologischer Befund: Starke Adipositas, Leib weich, nicht druckempfindlich. Vulva geschlossen, Vagina eng. Kleine Portio sieht nach vorne, Mm. geschlossenes Grübchen. Uterus anteflektiert, retrovertiert, klein. Die linken Adnexe sind verdickt und etwas druckempfindlich, aber wegen der Dicke der Bauchdecken nicht mit Sicherheit herauszutasten.

Diagnose: Sterilität, Hypomenorrhoe.

Behandlung: Verordnet Progynondragées à 2 000 ME. 3 Tabletten täglich. Nach 2 Monaten erscheint die Patientin am 3. 3. 1956 wieder. Sie fühlt sich viel wohler, die Kreuzschmerzen sind bedeutend besser geworden, die Regel ist nach wie vor schwach.

Befund: Vulva klappt etwas, im Spiegel etwas weißlicher Fluor. Vagina mittelweit, Portio zapfenförmig, Mm. geschlossenes Grübchen, sieht nach vorne. Uterus etwas retroponiert. Corpus anteflektiert, derb, etwas klein. Adnexe und Parametrien frei.

Beginn der Hormonbehandlung mit Progynoninjektionen. Nach Blutung am 27. 3. 56 werden je 10 000 IBE. injiziert am 30. 3., 1., 3., 6. und 8. 4. Daraufhin etwas stärkere Blutung am 17. 4., jedoch auch nur 1 Tag dauernd und von heftigen Leibschrmerzen und Erbrechen begleitet. Patientin gibt aber die Kur nicht so schnell auf und findet nach Verabreichung von je 10 000 IBE. am 23., 25., 27., und 29. 4., 2. 5. Belohnung dafür in einer ausgiebigen 5 tågigen Blutung vom 12.—17. 5. Dabei hatte sie lediglich etwas über Kreuzschmerzen zu klagen. Es folgen 3 mal 10 000 IBE. am 22., 25. und 27. 5. Darnach erscheint die Patientin freudestrahlend und berichtet von einer wiederum

5 tägigen Blutung vom 7.—12. 6. ohne jeglichen Schmerz oder irgendwelche Beschwerden; sie kann gar nicht verstehen, daß es so etwas auch gäbe, nachdem sie sich während des Unwohlseins immer ganz elend fühlte. Jetzt erhält Patientin nur 2 mal 10 000 IBE. Progynon am 15. und 17. 6., da sie sich auf eine Nordlandreise begibt. Von dieser kehrt sie gesund zurück, hatte nach knapp 4 wöchigem Intervall eine normale schmerzlose Blutung. Nachdem ich ihr nun schon 2 mal Progynon Dragées à 2 000 ME. zum Einnehmen in den ersten 14 Tagen post menstr. gegeben habe, berichtet sie über regelmäßige, normal starke Blutungen ohne die geringsten Beschwerden. Sie hofft nun doch noch auf Empfängnis.

Ergebnis: Behebung der Hypomenorrhoe durch Progynon B oleosum. Auftreten regelmäßiger, normaler Blutungen. Pat. fühlt sich jugendlich frisch und unternehmungslustig, hat keinerlei Beschwerden mehr zu klagen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Verwendung von Progynon B oleosum in vorliegenden Fällen von Amenorrhoeen und Oligo-Hypomenorrhoeen wirklich gute Erfolge gezeitigt hat. Dabei muß man bedenken, wie kompliziert die gesamte Genitalfunktion ist, wieviele psychische Momente in dieses Gebiet hineinspielen, wie individuell verschieden ein Fall vom andern ist! So waren alle Fälle mit schon bestehenden geringen Blutungen in unregelmäßigen Abständen viel schwieriger zu beeinflussen und der Erfolg oft nicht so schnell erreichbar wie bei überhaupt nicht blutenden Frauen. Von 9 derartigen Patientinnen bekamen 6 normalstarke Blutungen auf die Behandlung hin und obwohl jede von ihnen vorher andere Schmerzen zu klagen hatte, fühlten sich nun alle wohl und beschwerdefrei. 3 Frauen ließen außer der Periode mit normalem Blutverlust deutliches Wachstum ihres vorher zu kleinen Uterus erkennen. Außerdem erfolgte in einem Fall wünschenswerte Gewichtsabnahme, im anderen Gewichtszunahme. Bei den 11 amenorrhöischen Frauen gelang es

in 2 Fällen durch Progynon B oleosum je eine normale Regelblutung herbeizuführen, in zwei weiteren war daneben ein Wachstumserfolg des hypoplastischen Uterus eingetreten. Doch nicht allein durch Substitution bedingte Blutungen erfolgten, Progynon wirkte offenbar als Stimulans, wohl über die Hypophyse, das Ovar fing nach mehrfach empfangenen Impulsen wieder selbständig an zu arbeiten: 6 Frauen erfreuen sich nach mehr oder minder langer Behandlungszeit mit entsprechend großen Progynonmengen spontaner, beschwerdefreier, periodischer Blutungen und sind somit wieder in die Reihen der vollwertigen Frauen zurückgekehrt, jede mit dem Wunsch nach einem Kind. Dieser Wunsch ging einer Patientin schon nach dieser kurzen Behandlungszeit in Erfüllung!

In letzter Zeit mehren sich die Fälle, daß Frauen wegen Unfruchtbarkeit die Klinik aufsuchen. Diese Erscheinung, die als Beweis des wiedererwachten Fortpflanzungswillens gewertet werden darf, kennzeichnet den Umfang der bereits erzielten Wandlung in der seelischen Gesamthaltung unseres Volkes und ist die Frucht der staatlich begünstigten Aufklärung und einer gesunden Bevölkerungspolitik. Wenn wir nun im Progynon ein Mittel in der Hand haben die Unfruchtbarkeit zu beheben, so leisten wir mit seiner Anwendung praktische Bevölkerungspolitik, in dem wir wertvolles, bisher brachliegendes Fortpflanzungsgut zu neuem Leben erwecken, zum besten der Familie und des Volksganzen.

Herrn Prof. Dr. R. Dyroff danke ich herzlich für die freundliche Überlassung des Themas und Zuweisung der Patientinnen.

Schrifttum.

- Adler*, Hormontherapie in der Gynäkologie. (Wien. Klin. W[chr. 1934, II., Seite 915—920).
- Batisweiler*, Placentaextrakt Progynon (Schering-Kahlbaum). Bei Menstruationsstörungen u. Kastrationsfolgen. (ZBL. Gynäk. 1928, S. 2227 bis 2232).
- Buschbeck*, (M[chr. Gebh. Bd. 95, 1933, S. 341 und Bd. 98, 1934, S. 123).
- Neue Wege der Hormontherapie in der Gynäkologie. (D. m. W. 1934, 11, Seite 389).
 - Fortschritte der gynäkol. Hormontherapie. (M[chr. f. Gebh. und Gynäk. Bd. 98, Seite 344).
- Butenandt*, Untersuchungen über das weibliche Sexualhormon. Darstellung und Eigenschaften des kristallisierten Progynons. (Dt[sch. med. W[chr. 1929, II., Seite 2171—2173.)
- Neuere Ergebnisse auf dem Gebiet der Sexualhormone. (Wien. Klin. W[chr. 1934, II., Seite 897—901 und 934—936.)
- Clauberg*, Sichtbare Hormonwirkungen am menschlichen Uterus. (Med. Welt 1934, 14, Seite 477—480.)
- Die Wirksamkeit des Luteohormons, des [pez. Hormons des Corpus luteum, am menschlichen Uterus. (Zbl. Gynäk. 1932, S. 2460—2463.)
 - Grundlagen für die moderne Therapie mit weiblichen Sexualhormonen. (Med. Welt 1935, Seite 367—370 und 449—451.)
 - Zur Physiologie und Pathologie der Sexualhormone, im besonderen des Hormons des Corpus luteum. Der artefizielle Sexualzyklus am Uterus des kastrierten Kaninchens. (Ebl. Gynäk. 1931, S. 459—470.)
 - (Zt[chr. Gebh. 1934, Bd. 107, Seite 331.)
- Fels*, Indikationen und Erfolgsaussichten der Sexualhormontherapie bei Frauen. (Med. Welt 1933, Seite 1283—1283.)
- Gauß* und *Buschbeck*, Moderne Therapie mit Ovarialhormonen. (Arch. Gynäk. 156, Seite 328—330.)
- Gragerl*, Zur Hormontherapie bei oligohormonaler, sekundärer Amenorrhoe. (Zbl. Gynäk. 1932, Seite 2463—2469.)
- Hauptstein*, Zum Wirkungsmechanismus des Sexual-(Follikel)-Hormons I. (Endokrinol. 8, 1931, Seite 169—180.)
- Heidler*, Was kann die Hormontherapie bei gynäkologischen Erkrankungen leisten? (Wien. Med. W[chr. 1934, II., Seite 956—958 u. 990—993).

- Hübcher*, Der Einfluß von Ovarialhormonen auf Uterus[schleimhaut im Klimakterium. (Zbl. Gynäk. 1933, Seite 2844—2848.)
- Hoflweg*, Veränderungen des HVL. und des Ovars nach Behandlung mit hohen Dosen Follikelhormon. (Klin. W[chr. 1934, 3.)
- Janfon*, Mit sehr hohen Dosen Progynon behandelte primäre Amenorrhoe mit Uterushypoplasie. (Klin. W[chr. 1935, I., Seite 206.)
- Kaufmann*, Über die Therapie ovarieller Störungen mit Hormon der Keimdrüsen. (Med. Klin. 1932, II., Seite 955—957.)
- Umwandlung der Uterus[schleimhaut einer kastrierten Frau aus dem atrophischen Stadium in das der sekretorischen Funktion durch Ovarialhormone. (Zbl. Gynäk. 1932, Seite 2058—2061.)
 - Die Behandlung der Amenorrhoe mit hohen Dosen der Ovarialhormone. (Klin. W[chr. 1933, 2, Seite 1557—1562.)
 - Echte Menstruation bei einer kastrierten Frau durch Zufuhr von Ovarialhormonen. (Zbl. Gynäk. 1933, I., Seite 42.)
 - Die therapeutische Anwendung der weiblichen Keimdrüsenhormone. (Dt[sch. med. W[chr. 1935, 22, Seite 861.)
 - Die therapeutische Beeinflussung [schwerer Vulva- und Vaginaveränderungen mit Progynon B oleos. (Dt[sch. med. Wch[chr. 1933, Seite 861.)
- Last*, Weitere Erfahrungen mit Progynon-Steinach. (Med. Klin. 1931, I., Seite 776—777.)
- Lewin*, Der Einfluß des Zyklushormonpräparates Progynon auf die Sexualfunktion. (Zbl. Gynäk. 1931, Seite 2150—2161.)
- Loefer*, Künstliche Menstruation durch Zuführung von Ovarialhormonen bei einem Fall von hypoplastischem Genitale mit primärer Amenorrhoe. (Zt[schr. Gebh. 104, Seite 516—524.)
- Zur künstlichen Menstruationserzeugung durch Zuführung von Ovarialhormonen. (Zt[schr. Gebh. 105, Seite 503—505.)
- Neumann*, Die Therapie mit weiblichen Keimdrüsenhormonen. (Med. Klin. Nr. 3, 1936.)
- Novák*, Über den gegenwärtigen Stand der Sexualhormontherapie in der Gynäkologie. (Med. Klin. 1934, II., Seite 1089—1092.)
- Über die Behandlung von Menstruationsstörungen. (Wien. Klin. W[chr. 1932, II., Seite 1512—1515.)
- Novák* und *Last*, Klinische Erfahrungen mit Progynon, einem hochwertigen weiblichen Sexualhormon. (Med. Klin. 1928, II., S. 1785—1788.)
- Philipp*, Ovarialhormontherapie. (Med. Welt 1934, Seite 795—797.)
- Preißacker*, Über die weiblichen Sexualhormone und ihre klinische Bedeutung. (Wien. Klin. W[chr. 1934, I., Seite 743—746.)
- Preißacker* und *Stuhr*, Zur klinischen Anwendung von Progynon-Schering. (Zbl. Gynäk. 1931, Seite 2564—2574.)
- Schoeller*, *Dohrn* und *Hoflweg*, Die künstliche Auslösung des Sexualzyklus am Pavianweibchen; über die Brunst[schwellungen beim kastrierten Pavianweibchen nach subkutaner und peroraler Progynondarreichung. (Arch. Gynäk. 1932, Bd. 150, Seite 126—134.)

- Schoeller*, Die physiologische Follikelhormondosis der Frau. (Med. Klin. 1934, 21, Seite 679.)
- Schoeller* und *Strauß*, Zur Dosierung des Progynons. (Med. Mitteil. 1930, 8.)
- Schröder*, Handb. der Gynäkologie Veit-Stöckel 1928, Bd. I, H. 2. (Verh. Dtsch. Gef. Inn. Med. 1934.)
- Seitz*, Disk. Bemerk. zum Vortrag Buschbeck. (Zbl. Gynäk. 1934, 35, S. 2086.)
- Siebert*, Erfahrungen und Ergebnisse mit der Hormonbehandlung weiblicher Genitalstörungen. (Ztschr. f. Gebh. u. Gynäk. 1934, Nr. 107.)
- Strauß*, Stand der klinischen Erfahrungen mit Progynon. (Med. Mitteil. 1929, 5, Seite 216.)
- Streck*, Die Anwendung der Zyklushormontherapie in der Praxis. (Z. Gebh. 98, 1930, Seite 306—322.)
- Neue Wege und Ziele der Zyklushormontherapie. (Arch. Gynäk. 137, Seite 1051—1052.)
 - „Progynon“-Schering, ein neues Zyklushormonpräparat. Amenorrhoe (ohne und mit Hypoplasia genitalis). (Klin. Wschr., Jahrg. 7, Nr. 25, Seite 1172—1178.)
- Terruhn*, Zyklische Blutung operativ kastrierter Frauen durch perorale Hormonzufuhr. (Zbl. Gynäk. 1934, Seite 2007—2012.)
- Tietze*, (Arch. Gynäk. Bd. 57, Dtsch. Gef. Gynäk. Berlin, 11. 10. 1933.)
- Vogt*, Über den gegenwärtigen Stand der Lehre von der inneren Sekretion. (Med. Klin. 1930, II., Seite 1469—1472.)
- Weinzierl*, Die praktische Bedeutung der Hormonbehandlung in der Gynäkologie. (Med. Klin. 1934, 2, Seite 1486—1490.)
- Umfrage bei 9 Autoren: Die praktische Bedeutung der Hormonbehandlung in der Gynäkologie. (Med. Klin. 1934, II., Seite 959—965 und 1022—1026.)
-

Lebenslauf.

Ich wurde am 16. Januar 1911 als Tochter des Studienprofessors, damals wissenschaftlichen Hilfslehrers Dr. Julius Thomas und seiner Ehefrau Helene geb. Krahle in Bad Salzungen (Lippe) geboren. Den jeweiligen Versetzungen meines Vaters entsprechend kam ich in Bützow in Mecklenburg in die Vorschule, besuchte in Goldberg in Schlesien die ersten 3 Klassen des Realgymnasiums, in Coburg in Bayern die nächsten 6 Klassen der Oberrealschule Ernestinum, wo ich Ostern 1930 die Reifeprüfung ablegte. Am 1. Mai 1930 begann ich mein Medizinstudium an der Universität Erlangen, verbrachte hier meine ganze 11 semestrigende Studienzeit und bestand am 26. Okt. 1935 das ärztliche Staatsexamen vollständig.
